



Hand Des Protect

DGHM/VAH gelistet

Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

- mit rückfettenden Substanzen
- parfümfrei
- gebrauchsfertig



Präparatetyp

Alkoholische Lösung zur Desinfektion der Hände mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Viruzid wirksam gem. Europäischer Norm (EN 14476).

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
80 g Ethanol, 0,1 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, Chloride.

Anwendungsgebiete

Händedesinfektion, für die persönliche Händehygiene

Anwendung

Zum Auftragen auf die Hände und Unterarme.

Dosierung

Desinfektion der Hände (geprüft gem. EN 1500):
3 ml SAFELINE Hand Des Protect während 30 Sekunden auf beiden Händen verreiben.

Desinfektion der Hände und Unterarme (geprüft gem. EN 12791):
2 x 5 ml SAFELINE Hand Des Protect während 1,5 Minuten auf beiden Händen und Unterarmen verreiben. Die Haut muss während der gesamten Zeit feucht gehalten werden.

Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion	30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion	1,5 Min.
Bakterizid inkl. MRSA, Fungizid	30 Sek.
Tbc	30 Sek.
Noro-Viren gem. EN 14476	15 Sek.
Polio-Viren gem. EN 14476	1 Min.
Adeno-Viren gem. EN 14476	1 Min.

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
500 ml Flasche	1 x 500 ml	09911
1 Liter Flasche	1 x 1 L	09912
5 Liter Kanister	1 x 5 L	09913

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:
Gutachten zur Händedesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 28.05.2012.

Prof. Dr. Werner, Bischofshofen:
Gutachten zur Händedesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 06.08.2012.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
Gutachten zur Polio-Viren-Wirksamkeit vom 28.01.2009.
Gutachten zur Adeno-Viren-Wirksamkeit vom 17.02.2009.
Gutachten zur Noro-Viren-Wirksamkeit vom 20.08.2008.

Warnhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuzuführen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.